

Tratamiento quirúrgico de los sarcomas retroperitoneales en el HCQ Hermanos Ameijeiras.

Servicio Cirugía General

Dra. C Llpsy Fernández Santiesteban, Dra. Daniela Ariza Acuna

Resumen

Los sarcomas son tumores malignos que se originan en el denominado tejido conectivo o de soporte del organismo y se localizan en las partes blandas . Incluyen tejido graso, muscular, tendones, vasos sanguíneos, nervios y tejidos profundos de la piel. Los sarcomas de tejidos blandos y óseos son los principales tipos de sarcomas.

Constituyen el 0,1-0,2 % de todos los tumores malignos. 10-20 % de los sarcomas se localizan en el retroperitoneo y 80% de las neoplasias retroperitoneales son malignas.

La mayoría son de origen mesodérmico; los liposarcomas, leiomiomas y sarcomas pleomórficos constituyen hasta el 80% de estos tumores.El tratamiento de elección es quirúrgico, independientemente del tamaño de la lesión.

Se exponen imágenes de 2 casos intervenidos en el HHA. Desde 2017 a 2021 se han intervenidos 24 pacientes.

Conclusiones: La cirugía representa el tratamiento primario en sarcomas de retroperitoneo con mejores resultados a largo plazo. El beneficio de la quimioterapia y radioterapia no está bien definido.